

## ВАКЦИНАЦИЯ – САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики ГКУЗ «Луганский республиканский центр здоровья» ЛНР

Почему нужно прививаться от гриппа ежегодно?

Вирус гриппа относится к группе РНК-вирусов, отличающихся способностью быстро мутировать. Именно поэтому вакцины для профилактики гриппа обновляют ежегодно, и прививку нужно делать каждый год. Кроме этого, каждый месяц эффективность вакцинации уменьшается на 6-10% и через год вакцина уже не работает.

Нужно ли принять антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки, чтобы уменьшить реакцию на вакцину?

Здоровому человеку не требуется принимать какие-либо дополнительные лекарства до и после вакцинации. Если по состоянию здоровья человек должен получать лекарственные средства, например, для коррекции артериального давления, их применяют в том режиме и дозировке, которые рекомендовал врач.

Можно ли делать прививку от гриппа человеку, страдающему аллергическими заболеваниями?

Это зависит от того, на что именно у человека аллергия. Кому нельзя прививаться?

- Тем, у кого наблюдалась аллергическая реакция на белок куриного яйца;
- **•** Если на предыдущее введение противогриппозной вакцины была аллергическая реакция.

Можно ли делать прививку от гриппа, если у человека есть признаки простуды?

На фоне течения острой респираторной инфекции проводить вакцинопрофилактику не рекомендуется. Правильно будет сделать прививку после выздоровления.

Сколько нужно ждать после перенесенного ОРВИ или COVID-19? После перенесенного острого инфекционного заболевания необходимо воздержаться от вакцинации в течение двухчетырех недель в зависимости от тяжести течения инфекции. Сроки проведения вакцинации в индивидуальном порядке определит врач.

Не опасно ли делать прививку людям с хроническими заболеваниями?

Хронические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от гриппа. Напротив, эта категория населения, как и пожилые люди, входит в группу риска, так как заболевание гриппом чревато для них серьезными осложнениями. Поэтому они в первую очередь должны сделать прививку.

Что делать, если человек после прививки всетаки заболел гриппом? При гриппе, как и при любой другой вирусной инфекции, есть инкубационный период, когда человек уже заболел, но проявлений болезни еще нет. Сделанная в этот период прививка от гриппа не защитит от развития заболевания, но уменьшит тяжесть течения инфекции.